I NEED TO STAY HOME IF…

I have a fever	I am vomiting	I have diarrhea	I have a rash	I have head lice	I have an eye infection	I have been in the hospital
						
Temperature of 100.4 degrees F or higher	Within the past 24 hours	Within the past 24 hours	Body rash with itching or fever	Itchy head, active head lice**	Redness, itching, and/or pus draining from eye	Hospital stay and/or emergency room visit

I am ready to go back to school when I am…

Fever free without the assistance of medication for 24 hours (i.e., Tylenol, Motrin, Advil)	Free from vomiting for 24 hours.	Free from diarrhea for 24 hours.	Free from rash, itching or fever. I have been evaluated by my doctor if needed.	Treated with appropriate lice treatment at home.	Free from drainage and/or have been evaluated by my doctor if needed.	Released by my medical provider to return to school.

A student with head lice can no longer be excluded from school BUT it is highly recommended that the lice is treated properly before the student returns to school.

If your child has strep throat or another bacterial infection, he/she should stay home until the antibiotic has been given for at least 24 hours and your health care provider has given permission for your child to return to school. We encourage you to seek medical attention when your child is sick and to follow your health care provider's recommendations about returning to school and other activities.

NECESITO QUEDARME EN CASA SI…

TENGO FIEBRE	YO SOY VÓMITO	TENGO DIARREA	TENGO UNA ERUPCIÓN	TENGO CABEZA DE PIOJOS	TENGO UNA INFECCIÓN DE OJO	HE ESTADO EN EL HOSPITAL
						
Temperatura de 100.4 grados F o más	En las últimas 24 horas	En las últimas 24 horas	Salpullido corporal con picazón o fiebre	Picazón en la cabeza, piojos activos	Enrojecimiento, picazón y / o drenaje de pus del ojo	Visita a la sala de hospital y / o sala de emergencia

ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA CUANDO ESTOY …

Sin fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas (es decir, Tylenol, Motrin, Advil)	Libre de vómitos durante 24 horas.	Libre de vómitos durante 24 horas.	Libre de sarpullido, picazón o fiebre. He sido evaluado por mi médico si es necesario.	Tratado con tratamiento de piojos apropiado en casa.	Libre de drenaje y/o ha sido evaluado por mi médico si es necesario.	Publicado por mi proveedor de servicios médicos para regresar a la escuela.

Si su hijo tiene faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta que se le administre el antibiótico durante al menos 24 horas y su proveedor de atención médica le haya dado permiso para que regrese a la escuela. Le recomendamos que busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica sobre regresar a la escuela y otras actividades.